



КонсультантПлюс

"ГОСТ Р 55330-2012. Национальный стандарт
Российской Федерации. Семена аридных
кормовых культур. Посевные качества.
Технические условия"
(утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 29.11.2012 N 1648-ст)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 30.08.2021

Утвержден и введен в действие
[Приказом](#) Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 29 ноября 2012 г. N 1648-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕМЕНА АРИДНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Seeds of arid fodder crops. Sowing characteristics. Specifications

ГОСТ Р 55330-2012

ОКП 97 4000

ОКС 65.020.20

Дата введения
1 января 2014 года

Предисловие

1. Разработан Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом кормов имени В.Р. Вильямса Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИК Россельхозакадемии), Государственным научным учреждением Калмыцким научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ Калмыцкий НИИСХ Россельхозакадемии), Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский сельскохозяйственный центр" (ФГБУ "Россельхозцентр").

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 359 "Семена и посадочный материал".

3. Утвержден и введен в действие [Приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1648-ст.

4. Введен впервые.

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 ([раздел 8](#)). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru).

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на семена аридных кормовых культур и устанавливает требования к их посевным качествам.

Требования, обеспечивающие безопасность семян для жизни и здоровья людей, изложены в [4.1.4](#); требования к качеству семян - в [4.2](#); требования к маркировке - в [4.4](#).

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ Р 53361-2009](#) Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

[ГОСТ 12.0.004-90](#) Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

[ГОСТ 12.1.005-88](#) Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

[ГОСТ 12036-85](#) Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб

[ГОСТ 12037-81](#) Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян

[ГОСТ 12038-84](#) Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести

[ГОСТ 12041-82](#) Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности

[ГОСТ 12042-80](#) Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян

[ГОСТ 12045-97](#) Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями

[ГОСТ 12046-85](#) Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве

[ГОСТ 12047-85](#) Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества

[ГОСТ 14192-96](#) Маркировка грузов

[ГОСТ 20081-74](#) Семеноводческий процесс сельскохозяйственных культур. Основные понятия. Термины и определения

[ГОСТ 20290-74](#) Семена сельскохозяйственных культур. Определение посевных качеств семян. Термины и определения

[ГОСТ 24597-81](#) Пакеты товарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

[ГОСТ 30090-93](#) Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20081 и [ГОСТ 20290](#), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. оригинальные семена: Семена первичных звеньев семеноводства: питомников размножения и суперэлиты, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им лицом и предназначенные для дальнейшего размножения.

3.1.2. элитные семена: Семена, полученные от последующего размножения оригинальных семян.

3.1.3. репродукционные семена: Семена последующих после семян элиты поколений.

3.1.4. аридные культуры (aridus): Группа экологически специализированных видов растений, способных нормально функционировать и продуцировать в условиях сухого и жаркого климата пустынь, полупустынь и сухих степей.

3.2. Сокращения:

ОС - оригинальные.

ЭС - элитные.

РС - репродукционные.

НБ - на фильтровальной бумаге.

НП - на песке.

С - свет.

Т - темнота.

4. Технические требования

4.1. Общие требования к семенам

4.1.1. Для посева используют семена сортов, гибридов, внесенных в [\[1\]](#).

Допускается использование перспективных сортов, находящихся в сортоиспытании, дикорастущих популяций, приспособленных к экологическим условиям зоны.

4.1.2. Нормативные требования на посевные качества в зависимости от этапа размножения установлены для следующих категорий семян: оригинальные (ОС), элитные (ЭС) и репродукционные (РС).

4.1.3. Семена, не отвечающие по посевным качествам требованиям настоящего стандарта для заявленных категорий, переводят в более низкую категорию, если показатели качества семян будут ей соответствовать.

Перевод в более низкую категорию допускается только при невозможности повышения качества путем дополнительной обработки семян.

4.1.4. В семенах аридных кормовых культур не допускается наличие:

- карантинных сорняков (семена, плоды), вредителей и болезней, имеющих карантинное значение для Российской Федерации в соответствии с [перечнем \[2\]](#);

- семян ядовитых сорняков - софоры лисохвостной (*Sophora alopecuroides* L.), гелиотропа европейского (*Heliotropium europaicum* L.), гелиотропа эллиптического волосистоплодного (*Heliotropium*

ellipticum L.), ежевника безлистного (*Anabasis aphylla* L.), безвременника (*Colchicum* L.), гормелы обыкновенной (*Peganum harmala* L.), триходесмы седой (*Trichodesma incanum* (Vge) D.C.), полыни беловатой (*Artemisia compacta* Fisch ex D.C.), брунца лисохвостного (*Sophora alopecuroides* L.);

- живых вредителей и личинок, повреждающих семена: клопов, колосовых мух, лугового мотылька в семенах злаковых трав, полыни, солянок;

- живых экземпляров клеща (*Acarus siro* L.), за исключением репродукционных семян, в которых допускается его наличие не более 20 шт/кг.

4.1.5. Наиболее вредными сорняками для аридных кормовых культур являются: полынь метельчатая (*Artemisia scoraria* Wet K.), ковыль волосатик (*Stipa capillata* L.), рогач (эбелек) (*Ceratocarpus arrenarius* L.), дурнишник игольчатый (*Xanthium spinosum* L.), люцерна маленькая (*Medicago minima* Cirufberg), солянка натронная (*Salsola nitraria* Pall.), зопник волосистоцветный (*Phlomis thapsoides* Vge.); кроме того, для терескена: солянка чумная (*Salsola pestifer* Nees); для злаковых трав: бодяк щетинистый (*Cirsium setosium* M.B.).

4.2. Требования к качеству семян

4.2.1. Посевные качества семян аридных кормовых культур должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 1.

Таблица 1

Посевные качества семян аридных кормовых культур

Наименование кормовой культуры	Категория семян	Чистота, %, не менее	Содержание семян сорняков		Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
			Всего, %, не более	в т.ч. семян наиболее вредных сорняков, шт. на 1 кг, не более		
Житняк сибирский <i>Agropyron sibiricum</i> (Willd) Beauv.	ОС, ЭС РС	95,00 90,00	0,50 1,00	100 200	80 70	15,0 15,0
Житняк пустынный <i>Agropyron desertorum</i> (Fisch. ex Link) Schult.	ОС, ЭС РС	95,00 90,00	0,50 1,00	100 200	80 70	15,0 15,0
Камфоросма Лессинга <i>Camphorosma lessingii</i> Litv.	ОС, ЭС РС	40,00 35,00	1,50 2,50	200 400	60 50	15,0 15,0
Климакоптера мясистая <i>Climacoptera crassa</i> (Bieb) Botchsh.	ОС, ЭС РС	50,00 40,00	1,50 2,50	300 500	50 45	12,0 12,0
Климакоптера шерстистая <i>Climacoptera lanata</i> (Pall.) Botchsh.	ОС, ЭС РС	50,00 40,00	1,50 2,50	300 500	50 45	12,0 12,0
Ковыль Лессинга <i>Stipa lessingiana</i> Trin & Rupr.	ОС, ЭС РС	80,00 75,00	1,00 1,50	200 400	75 65	15,0 15,0
Кострец кровельный <i>Bromus tectorum</i> L.	ОС, ЭС РС	85,00 80,00	1,00 1,50	200 400	75 65	15,0 15,0
Колосняк гигантский <i>Elymus giganteus</i> Vahl	ОС, ЭС РС	90,00 80,00	0,50 1,00	200 400	80 70	12,0 12,0
Кохия веничная <i>Kochia scoraria</i> (L.) Shrad.	ОС, ЭС РС	50,00 40,00	1,50 2,50	200 400	60 50	12,0 12,0

Кохия простертая (прутняк, изень) <i>Kochia prostrata</i> (L.) Shrad.	ОС, ЭС РС	50,00 35,00	1,50 2,50	200 400	60 50	12,0 12,0
Лебеда белая <i>Atriplex cana</i> С.А. Mey.	ОС, ЭС РС	50,00 40,00	1,50 2,50	200 400	60 50	12,0 12,0
Лебеда бородавчатая <i>Atriplex verrucifera</i> Vieb.	ОС, ЭС РС	50,00 40,00	1,50 2,50	200 400	60 50	12,0 12,0
Мятлик луковичный <i>Poa bulbosa</i> L.	ОС, ЭС РС	70,00 60,00	0,50 1,00	200 400	60 50	12,0 12,0
Полынь развесистая <i>Artemisia diffusa</i> Krasch. ex Poljak	ОС, ЭС РС	50,00 40,00	1,50 2,50	200 400	60 50	13,0 13,0
Полынь мелкоцветковая <i>Artemisia pauciflora</i> Web.	ОС, ЭС РС	40,00 35,00	1,50 2,50	200 400	60 50	13,0 13,0
Полынь Лерха (белая) <i>Artemisia lerchiana</i> Web.	ОС, ЭС РС	40,00 35,00	1,50 2,50	200 400	60 50	13,0 13,0
Саксаул белый (песчаный) <i>Haloxylon persicum</i> Bunde ex Boiss. & Buhse	ОС, ЭС РС	60,00 50,00	1,50 2,50	200 300	60 50	13,0 13,0
Саксаул черный <i>Haloxylon aphyllum</i> (Minkw.) Iljin	ОС, ЭС РС	60,00 50,00	1,50 2,50	200 300	60 50	13,0 13,0
Саликорния европейская <i>Salicornia europaea</i> L.	ОС, ЭС РС	60,00 50,00	1,50 2,50	300 500	65 55	12,0 12,0
Сведа дуголистная <i>Suaeda arcuata</i> Bunge	ОС, ЭС РС	60,00 50,00	1,50 2,50	300 500	65 55	12,0 12,0
Солодка голая <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	ОС, ЭС РС	94,00 90,00	0,50 1,00	100 200	80 70	13,0 13,0

Солодка уральская <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	ОС, ЭС РС	94,00 90,00	0,50 1,00	100 200	80 70	13,0 13,0
Солянка восточная (кейреук) <i>Salsola orientalis</i> S.G. Gmel	ОС, ЭС РС	65,00 55,00	1,00 1,50	300 500	65 55	12,0 12,0
Солянка (черкез) Палецкого <i>Salsola paletziana</i> Litv.	ОС, ЭС РС	60,00 50,00	1,20 1,50	300 500	50 40	13,0 13,0
Солянка (черкез) Рихтера <i>Salsola richteri</i> (Mog.) Kar. ex Litv.	ОС, ЭС РС	60,00 50,00	1,20 1,50	300 500	50 40	13,0 13,0
Солянка малолистная (чогон) <i>Aellenia subaphilla</i> C.A. Mey	ОС, ЭС РС	65,00 55,00	1,00 1,50	300 500	50 45	12,0 12,0
Терескен серый <i>Eurotia ceratoides</i> (L.) C.A. Mey	ОС, ЭС РС	40,00 35,00	1,00 2,50	200 400	65 50	12,0 12,0
Типчак (овсяница желобчатая) <i>Festuca sulcata</i> (Hack.) Nym. p.p.	ОС, ЭС РС	80,00 75,00	1,00 2,50	200 400	70 65	13,0 13,0
Джузгун (кандым) Голова медузы <i>Calligonum caput-medusae</i> Schrenk	ОС, ЭС РС	60,00 50,00	1,00 1,50	200 400	40 35	13,0 13,0

Примечание. Семена дикорастущих популяций относятся к категории репродукционных (РС) и по посевным качествам должны соответствовать их требованиям.

4.2.2. В семенах аридных кормовых культур допускается наличие:

- головневых мешочков, головневых колосков и их частей, %, не более: ОС, ЭС - 0,05; РС - 0,1 в семенах злаковых трав;
- склероций спорыньи, %, не более: ОС, ЭС - 0,05; РС - 0,2 в семенах злаковых трав;
- обрубленных семян, %, не более: ОС, ЭС - 10, РС - 30 - в семенах злаковых трав, полыни, кохии, сведы, солянок, камфоросмы.

4.3. Упаковка

4.3.1. Упаковка семян - в соответствии с правилами реализации и транспортирования семян по [3] со следующим дополнением.

4.3.1.1. Семена аридных кормовых культур (оригинальные, элитные и репродукционные), предназначенные для реализации на семенные цели, подлежат упаковке. Семена упаковывают в тканевые по [ГОСТ 30090](#) или бумажные мешки по [ГОСТ Р 53361](#), пакеты и другие типы контейнеров массой нетто не более 50 кг.

4.3.1.2. Семена, предназначенные для использования на собственные нужды, допускается хранить насыпью.

4.3.1.3. Партии семян, обработанные химическими или биологическими препаратами, упаковывают в четырехслойные непропитанные бумажные мешки по [ГОСТ Р 53361](#).

4.3.1.4. Каждый затаренный мешок должен быть зашит и иметь внутреннюю и наружную этикетки (ярлыки).

4.4. Маркировка

4.4.1. Маркировка семян - по [3] со следующим дополнением:

На наружную этикетку наносят следующую информацию:

- наименование культуры;
- сорт, гибрид;
- категория (для РС и поколение);
- год урожая;
- номер партии;
- масса упаковочной единицы, нетто;
- происхождение семян;
- наименование протравителя и пленкообразующего вещества;
- номер документа, удостоверяющего сортовые и посевные качества семян <*>;
- обозначение настоящего стандарта.

<*> Правила установления срока действия документа, удостоверяющего посевные качества семян,

продления срока действия, выдачи нового документа и сроки его действия - по [ГОСТ 12046](#).

4.4.2. Указанная информация может быть нанесена непосредственно на упаковку (мешок) несмываемой краской или иным способом. В этом случае внутреннюю этикетку не вкладывают.

На внутренней этикетке, вкладываемой в упаковку, допускается указывать наименование культуры, сорта и номер партии.

На каждой упаковке с протравленными семенами должна быть предупредительная надпись: "Протравлено. Ядовито".

4.4.3. Транспортная маркировка - по [ГОСТ 14192](#).

5. Правила приемки

5.1. Партия семян - по [\[4\]](#). На каждую партию семян выдают документ, удостоверяющий сортовые и посевные <*> качества семян.

<*> Правила установления срока действия документа, удостоверяющего посевные качества семян, продления срока действия, выдачи нового документа и сроки его действия - по [ГОСТ 12046](#).

5.2. Правила приемки и отбор проб семян - по [ГОСТ 12036](#) со следующим дополнением.

Каждую упаковочную единицу просматривают для установления соответствия упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта и отсутствия повреждений, отрицательно влияющих на качество семян.

5.3. Масса партии и лабораторной пробы - в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Наименование кормовой культуры	Масса партии, кг, не более	Масса лабораторной пробы, г <*>
Житняк сибирский	10000	50
Житняк пустынный	10000	50
Камфоросма Лессинга	500	50
Климакоптера мясистая	500	50
Климакоптера шерстистая	500	50
Колосняк гигантский	10000	60
Ковыль Лессинга	10000	60
Кострец кровельный	10000	60
Кохия вечная	500	30
Кохия простертая (прутняк)	500	30
Лебеда белая	500	50

Лебеда бородавчатая	500	50
Мятлик луковичный	10000	30
Полынь Лерха	500	30
Полынь мелкоцветковая	500	30
Полынь развесистая	500	30
Саксаул белый	500	50
Саксаул черный	500	50
Саликорния европейская	500	50
Сведа дуголистная	500	50
Солодка голая	10000	100
Солодка уральская	10000	100
Солянка восточная	500	30
Солянка малолистная (чогон)	500	30
Солянка (черкез) Палецкого	500	30
Солянка (черкез) Рихтера	500	30
Терескен серый	500	50
Типчак (овсяница желобчатая)	10000	30
Джужгун (кандым)	500	150
<*> Допускается отклонение массы лабораторной пробы +/- 10%.		

6. Методы контроля

6.1. Определение чистоты, отхода семян и содержания примесей в семенах - по [ГОСТ 12037](#). Масса анализируемой пробы для определения чистоты и отхода семян - в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Наименование кормовой культуры	Масса анализируемой пробы, г
Житняк сибирский	4
Житняк пустынный	4
Камфоросма Лессинга	2
Климакоптера мясистая	2
Климакоптера шерстистая	2

Колосняк гигантский	6
Ковыль Лессинга	5
Кострец кровельный	6
Кохия веничная	2
Кохия простертая (прутняк)	2
Лебеда белая	2
Лебеда бородавчатая	2
Мятлик луковичный	3
Полынь Лерха	1
Полынь мелкоцветковая	1
Полынь развесистая	1
Саксаул белый	15
Саксаул черный	15
Саликорния европейская	2
Сведа дуголистная	2
Солодка голая	30
Солодка уральская	30
Солянка восточная (кейреук)	5
Солянка малолистная (чогон)	10
Солянка (черкез) Палецкого	5
Солянка (черкез) Рихтера	5
Терескен серый	2
Типчак (овсяница желобчатая)	3
Джузгун (кандым)	15

6.2. Определение всхожести семян - по [ГОСТ 12038](#). Условия проращивания - в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Технические условия определения всхожести семян

Наименование кормовой культуры	Условия проращивания				Срок определения, сут	
	Ложе	Температура, °С		Освещенность	Энергия прорастания	Всхожесть
		постоянная	переменная			
Житняк сибирский	НБ	-	20 - 30	С, Т	5	14
Житняк пустынный	НБ	-	20 - 30	С, Т	5	14
Камфоросма Лессинга	НБ	-	20 - 30	С, Т	7	14
Климакоптера мясистая	НП, НБ	30	-	С	7	14
Климакоптера шерстистая	НП, НБ	30	20 - 30	С	7	14
Колосняк гигантский	НБ	-	20 - 30	С	7	14
Ковыль Лессинга	НБ	-	20 - 30	С, Т	7	14
Кострец кровельный	НБ	-	20 - 30	С, Т	7	14
Кохия веничная	НП, НБ	-	20 - 30	С	7	14
Кохия простертая (прутняк)	НП, НБ	-	20 - 30	С	7	14
Лебеда белая	НП, НБ	-	20 - 30	С	7	14
Лебеда бородавчатая	НП, НБ	-	20 - 30	С	7	14
Мятлик луковичный	НБ	-	20 - 30	С, Т	7	21
Полынь Лерха	НБ	-	20 - 30	С	7	14
Полынь мелкоцветковая	НБ	-	20 - 30	С	7	14
Полынь развесистая	НБ	-	20 - 30	С	7	14
Саксаул белый	НП, НБ	-	20 - 30	С	9	21

Саксаул черный	НП, НБ	-	20 - 30	С	9	21
Саликорния европейская	НП, НБ	-	20 - 30	С	7	14
Сведа дуголистная	НП, НБ	-	20 - 30	С, Т	7	14
Солодка голая	НП	-	30 - 40	С, Т	4	10
Солодка уральская	НП	-	30 - 40	С, Т	4	10
Солянка восточная	НП, НБ	20	8 - 10	С, Т	7	12
Солянка малоллистная (чогон)	НП, НБ	-	10 - 20	С, Т	7	12
Солянка (черкез) Палецкого	НП, НБ	-	10 - 20	С, Т	7	12
Солянка (черкез) Рихтера	НП, НБ	-	10 - 20	С, Т	7	12
Терескен серый	НП, НБ	-	20 - 30	С, Т	7	14
Типчак (овсяница желобчатая)	НБ	-	20 - 30	С, Т	7	21
Джузгун (кандым)	НП, НБ	-	20 - 30	С, Т	7	14

Примечание. Для определения всхожести семян солянок семена предварительно замачивают в течение суток в воде при комнатной температуре, сменяя ее не менее трех раз, и высушивают при температуре 30 °С - 37 °С до сыпучести семян; перед проращиванием семена солодки следует обработать в течение 35 мин концентрированной серной кислотой (удельный вес 1,84) и промыть проточной водой, соблюдая технику безопасности при работе с серной кислотой.

6.3. Определение влажности семян - по [ГОСТ 12041](#). Семена высушивают при температуре 130 °С в течение 60 мин без размалывания.

6.4. Определение заселенности семян вредителями - по ГОСТ 12045, масса лабораторной пробы - по [ГОСТ 12036](#).

Примечания

1. Определение посевных качеств семян в спорных случаях - по ГОСТ 12047 или [\[5\]](#).
2. Для установления нормы высева определяют массу 1000 семян по [ГОСТ 12042](#).
3. Сортовые качества семенных посевов - по [\[6\]](#) и в соответствии с [\[4\]](#).

7. Транспортирование и хранение

7.1. Семена аридных кормовых культур транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При этом должна быть обеспечена их полная сохранность от порчи и засорения семенами других растений.

7.1.1. При транспортировании семян железнодорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средства.

7.1.2. Транспортирование семян осуществляют в пакетах по [ГОСТ 24597](#). Высота пакета не должна превышать 1,2 м, масса одного пакета не более 1 т.

7.2. Подготовленные к посеву и реализации семена хранят в закрытых, хорошо проветриваемых, обеззараженных складах напольного типа в условиях, предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу.

Протравленные семена хранят в изолированном помещении с соблюдением установленных санитарных правил.

Хранить репродукционные семена соянок, полыни, терескена следует рассыпанными слоем 0,3 - 0,4 м и периодически, один-два раза в неделю перелопачивать; репродукционные семена злаковых трав и солодки допускается хранить насыпью высотой не более 0,5 м.

7.2.1. В складах с асфальтированным или бетонным полом семена, затаренные в мешки, укладывают на поддоны или деревянный настил, отстоящий от пола не менее чем на 15 см.

7.2.2. Мешки укладывают в штабель двойником или тройником, длина штабеля определяется размером складской площади и величиной партии. Высота штабеля должна быть не более 4 рядов мешков, уложенных друг на друга. Проходы между штабелями и стенами складского помещения должны быть не менее 0,7 м, а проходы между штабелями для операций приема и отпуска семян должны быть не менее 1,5 м.

7.2.3. Уложенные в штабеля мешки с семенами перекадывают не менее одного раза в месяц, при этом верхние ряды мешков укладывают в нижний ряд, нижние - наверх.

7.2.4. Рекомендуются следующие сроки хранения семян: соянок - 6 - 8 мес., терескена - 18 мес., полыни - до 5 мес., злаковых трав и солодки - 3 - 7 лет. При хранении в регулируемой газовой среде (РГС) срок хранения семян может быть увеличен в два раза.

8. Требования безопасности и охраны окружающей среды

8.1. Требования безопасности для здоровья людей при работе с семенами аридных кормовых культур и окружающей природной среды - в соответствии с требованиями [ГОСТ 12.0.004](#), [ГОСТ 12.1.005](#).

8.2. Тара и упаковка партий семян, обработанных химическими или биологическими препаратами, должны иметь соответствующие надписи и сопроводительные документы, определяющие порядок обращения с такими семенами и содержащие сведения о возможных негативных воздействиях на здоровье людей и окружающую природную среду.

Приложение А
(справочное)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АРИДНЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

А.1. Алфавитный указатель аридных кормовых культур приведен в таблице А.1.

Таблица А.1

Русское наименование	Латинское наименование	Семейство
Джузгун (кандым)	<i>Calligonum caput-medusae</i> Schrenk	Polygonaceae (Гречишные)
Житняк сибирский	<i>Agropyron sibiricum</i> (Willd) Beauv.	Poaceae (Злаковые)
Житняк пустынный	<i>Agropyron desertorum</i> Fisch. ex Link	Poaceae (Злаковые)
Камфоросма Лессинга	<i>Camphorosma lessingii</i> Litv.	Chenopodiaceae (Маревые)
Климакоптера мясистая	<i>Climacoptera crassa</i> (Bieb) Botcsh.	Chenopodiaceae (Маревые)
Климакоптера шерстистая	<i>Climacoptera lanata</i> (Pall) Botcsh.	Chenopodiaceae (Маревые)
Колосняк гигантский	<i>Elymus giganteus</i> Vahl	Poaceae (Злаковые)
Ковыль Лессинга	<i>Stipa lessingiana</i> Trin. & Rupr.	Poaceae (Злаковые)
Кострец кровельный	<i>Bromus tectorum</i> L.	Poaceae (Злаковые)
Кохия веничная	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Shrad.	Chenopodiaceae (Маревые,)
Кохия простертая (прутняк)	<i>Kochia prostrata</i> (L.) Shrad.	Chenopodiaceae (Маревые)
Лебеда белая	<i>Atriplex cana</i> C.A. Mey.	Chenopodiaceae (Маревые)
Лебеда бородавчатая	<i>Atriplex verrucifera</i> Bieb.	Chenopodiaceae (Маревые)
Мятлик луковичный	<i>Poa bulbosa</i> L.	Poaceae (Злаковые)
Полынь Лерха (белая)	<i>Artemisia Lerchiana</i> Web.	Asteraceae (Сложноцветные)
Полынь мелкоцветковая	<i>Artemisia pauciflora</i> Web.	Asteraceae (Сложноцветные)
Полынь развесистая	<i>Artemisia diffusa</i> Krasch. ex Poljak	Asteraceae (Сложноцветные)
Саксаул белый (песчаный)	<i>Haloxylon persicum</i> Bunde ex Boiss.	Chenopodiaceae (Маревые)
Саксаул черный	<i>Haloxylon aphyllum</i> (Minkw.) Ljin	Chenopodiaceae (Маревые)

Саликорния европейская	<i>Salicornia europaea</i> L.	Chenopodiaceae (Маревые)
Сведа дуголистная	<i>Suaeda arcuata</i> Bunge	Chenopodiaceae (Маревые)
Солодка голая	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Fabaceae (Бобовые)
Солодка уральская	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	Fabaceae (Бобовые)
Солянка восточная	<i>Salsola orientalis</i> S.G. Gmel	Chenopodiaceae (Маревые)
Солянка малolistная (чогон)	<i>Aellenia subaphylla</i> C.A. Mey.	Chenopodiaceae (Маревые)
Солянка (черкез) Палецкого	<i>Salsola paletziana</i> Litv.	Chenopodiaceae (Маревые)
Солянка (черкез) Рихтера	<i>Salsola richteri</i> (Mog.) Kar. ex Litv.	Chenopodiaceae (Маревые)
Терескен серый	<i>Eurotia ceratoides</i> (L.) C.A. Mey	Chenopodiaceae (Маревые)
Типчак (овсяница желобчатая)	<i>Festuca sulcata</i> (Hack.) Nym. p.p.	Poaceae (Злаковые)

БИБЛИОГРАФИЯ <*>

<*> При пользовании настоящим стандартом необходимо убедиться, что настоящие документы Библиографии сохраняют действие. В случае замены (изменения) документов следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

- [1] Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Ежегодное официальное издание ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений"
- [2] [Перечень](#) карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений (сорняков)). Утвержден Минсельхозом России (приказ от 26.12.2007 г. N 673)
- [3] [Порядок](#) реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений. Утвержден Минсельхозпрода России (приказ от 18.10.1999 г. N 707)
- [4] Федеральный [закон](#) "О семеноводстве" от 17.12.1997 г. N 149-ФЗ
- [5] [Правила](#) проведения сравнительных анализов семян сельскохозяйственных растений в спорных случаях. Утверждены Минсельхозпродом России (приказ от 06.10.1999 г. N 689)
- [6] Инструкция по апробации сортовых посевов, 2 часть. Утверждена Минсельхозпродом России 21.06.1994 г. N 14